

医療・介護のことでお悩みはありませんか？

IMSグループイムス総合サービスセンターが、みなさまからの医療・介護のご相談をお受けいたします。
詳しくはホームページをご覧ください。

来訪もしくは、お電話かホームページ(メールフォーム)よりお問い合わせください。

0800-800-1632 **03-3989-1141** (代表)
※「050」からはじまるIP電話および国際電話からはご利用いただけません。 受付時間/平日8:30~17:30 土曜日8:30~12:30(日祝・年末年始休み)

イムス総合サービスセンターのサービス内容や、IMSグループの最新情報をご覧ください。

<http://www.ims.gr.jp/gscnter/>

〒170-0013 東京都豊島区東池袋1-21-11 オーク池袋ビルディング8F

イムス富士見総合病院 採用情報

当院では、120床増床に向けて下記職種を募集しています。


看護師・薬剤師・放射線技師・臨床検査技師・臨床工学技士・理学療法士・
作業療法士・言語聴覚士・栄養士

詳しくは、下記連絡先までお問い合わせください。

TEL.049-256-7771(採用直通) fujimi.saiyo@ims.gr.jp

総務課 採用担当

病院へのアクセスガイド



- 電車をご利用の方
東武東上線「鶴瀬駅」下車
ライブス「中央図書館」下車2分
- タクシーをご利用の方
東武東上線「鶴瀬駅」、「みずほ台」より5分
- お車をご利用の方
富士見・川越道路「鶴瀬出口」より1分
関越自動車道「三芳1.C」より20分



PLAZA IMS プラザイムス

2015年1月
Vol.12
冬号

イムス富士見総合病院

「プラザイムス」は、患者さま、ご家族のみなさまに院内やIMSグループの医療活動、病状に関する情報をお伝えするコミュニケーションペーパーです。

院長のごあいさつ

今年、イムス富士見は、ビッグプロジェクト「新棟増築120床増床」に向かって突撃します。外来部門、手術部門の拡張も合わせて実施します。年明け早々工事が始まり、1年をかけて新棟が立ち上がります。この間われわれは、新棟に魂を注入できるような病院一丸となって準備作業を行ってまいります。そして、地域のみなさまのニーズにひとつでも多く対応できるよう努力してまいります。今後とも当院のこと、よろしくお願いいたします。



スズキ ノブホ
院長 鈴木 義隆

医師新入職員のごあいさつ

平成26年9月1日よりイムス富士見総合病院に赴任しました本多正彦です。

主に担当させていただくのは消化器内科ですが、それ以外の分野の疾患についても治療にあたらせていただきますので何なりとお申しつけください。

もちろん、消化器疾患に対する内視鏡検査を含む諸検査などは臨機応変に対応させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。



ホンダ マサヒコ
内科医 本多 正彦

SCU (Surgical Care Unit) が開設しました!

24時間体制で監視が必要な重症患者さまを受け入れる集中治療室が、5F病棟に完成。平成26年10月から始動しました。

さらに安心して患者さまが治療に専念できるようにスタッフ一同、がんばります!

SCU入室対象疾患

- 脳神経外科疾患
 - ・急性期脳卒中疾患 ・開頭手術後
 - ・脊椎脊髄手術後
- 外科・胃腸科術後
- 血管外科術後
- 重症呼吸器疾患など



脳神経外科からのお知らせ

— 脳卒中に注意しよう! —

今年も寒い季節になりました。特に脳卒中が心配な時期です。

現在、高血圧症・糖尿病・脂質異常症(高コレステロール血症、高脂血症)・全身血管系(心臓、末梢血管)の病気で治療中の方、ご家族で脳卒中(脳梗塞・脳出血・くも膜下出血)の既往歴がある方は、大事に至る前にしっかり頭部および頸部の検査を行い、脳卒中の予防に努めましょう。備えあれば憂いなしです!

検査方法
脳神経外科を受診してください。

- ① 頭部MRI・MRA
脳内の小さな新しい脳梗塞(急性期)から古い(陳旧性)脳梗塞を発見できます。脳梗塞の原因となる脳および頸動脈の細さが分かります。さらに、くも膜下出血の原因となる脳動脈瘤を発見できます。

- ② 頸動脈エコー
頸動脈の動脈硬化をチェックして、脳梗塞の危険性について簡単に判別します。

治療法

検査で異常が出た場合、さらに精密検査が必要です。食事療法や内服治療の強化を行い、これが不十分な場合は、外科治療の必要性について検討していきます。

担当医: 脳神経外科 部長 鷲内 隆雄

病状についてもっと知りたい方は、当院脳神経外科ホームページを参照してください。

<http://www.ims.gr.jp/fujimisougou/neurosurgery/>

子供のくすり ~ 飲ませ方と注意点 ~

子供が病気になったとき、くすりを嫌がって飲んでくれないことがあります。そんなときに上手に飲ませるコツや注意点をいくつかご紹介します。



赤ちゃんの場合

シロップ剤: 哺乳瓶を使う場合はシロップ剤を乳首に入れてそのままくわえさせてください。哺乳瓶を使わない場合はスポイトや小スプーンを使用します。その際、スポイトなら3~4滴、小スプーンなら3分の1の量を口の奥の方に入れます。シロップ剤は味が強いものが多いので、くすりの後に白湯やお茶を飲ませてください。

粉薬: 少量の水でだんご状にしてほほの内側か上あごに塗り付けます。その後、すぐに白湯やお茶を飲ませ流し込みます。

※ミルクにくすりを混ぜるとミルク嫌いになる可能性があるためなるべく混ぜないようにしましょう!

※赤ちゃんにハチミツを与えると乳児ボツリヌス症という病気にかかることがありますので控えるようにしてください。

幼児の場合

粉薬を水や白湯に溶かすときは水の量が多いと嫌がって飲んでもない場合があるため、ひとくちで飲みきれぬ量にします。それでも飲めない場合はジュースやアイス、ヨーグルト、チョコレートを使用する方法もあります。特に味が濃いチョコ味のアイスクリームやクリームがおすすめです。

※マクロライド系の抗生剤(クラリスロマイシンやアジスロマイシンなど)は酸味のあるヨーグルトやスポーツ飲料、果汁ジュースに混ぜると苦みが増すため注意してください。

※粉薬は飲む直前に溶かし、溶かしたらすぐ飲ませてください。時間がたつと薬の苦味が出たり、くすりの効果が下がることがあります。

くすりを飲ませるタイミング

授乳後にのませると、満腹でくすりを嫌がったり、ミルクと一緒に吐いてしまうことがあるので、食後のくすりでも空腹時や授乳前に飲ませることをおすすめします。

その他の注意点

子供のくすりは、症状の他、子供の体重や成長の度合いに合わせてくすりの量を決めています。兄弟の余ったくすりを飲ませるのは絶対にやめましょう!!



患者さまからのご意見

患者さまやご家族からの病院へのご意見をご紹介します。毎回貴重なご意見をいただき、ありがとうございます。今回掲載のご意見以外も職員で情報共有し、改善に努めてまいります。

＼ご意見1／

リハビリに通っています。リハビリ室のトイレに着替える服を入れるバッグを置く場所がなく困っています。トイレで着替えて手を洗う際に洗面台に置きたいのですが、水で濡れていて置けません。備え付けのペーパーでは綺麗に水を切ることは出来ないで、小さなタオルでも結構ですので鏡の前に置いてください。

→ 回答

ご意見ありがとうございます。トイレのご使用に際しご不便をおかけして申し訳ございません。トイレの手洗い場につきましては水拭き用タオルを常備しておくのは院内感染防止の観点から実施出来かねます。手洗い場の水はねを防止するため、対策としてハンドソープとペーパータオルの位置関係の見直しを行いました。みなさまが快適にご利用できるよう改善に努めてまいります。

＼ご意見2／



送迎バスの中間地点の駐車場にゴミやペットボトルが散らかっています。ご対応をよろしくお願ひいたします。

→ 回答

ご意見ありがとうございます。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。常駐管理を行っており、放火等の恐れからゴミ箱の設置も控えております。今後、定期清掃を行い、患者さまが気持ちよくご利用できるバス停の維持に努めてまいります。

＼ご意見3／

再診で受診しました。システムを丁寧に教えていただき、気分が良かったです。待合室が広く静かで落ち着き、会計もスムーズでした。何よりもスタッフがとてもきびきびとしていて、笑顔が素敵で心も癒されました。

→ 回答

この度はお褒めのお言葉をいただきありがとうございます。スタッフ一同、来院される患者さまの病状やケガによる不安を少しでもやわらげ、笑顔で親切丁寧な対応を心がけています。今後とも安心して医療を受けていただけるよう尽力していきますので、よろしくお願ひ申し上げます。