

PLAZA IMS



プラザイムス イムス札幌消化器中央総合病院

「プラザイムス」は、患者様、ご家族のみなさまに院内やIMSグループの医療活動、病気に関する情報をお伝えするコミュニケーションペーパーです。

外科特集

食道がんについて

食道がんの検査・治療 予防、早期発見のポイント

外来診療予定表

当院の感染症対策について

PLAZA IMS

IMSグループ 医療法人社団 前住会
イムス札幌消化器中央総合病院

2020年（令和2年）10月発行 発行責任者：イムス札幌消化器中央総合病院 Vol.11
〒063-0842 札幌市西区八軒2条西1丁目1-1 TEL:011-611-1391 FAX:011-621-1100

外来診療予定表

令和2年10月時点

	診療科	月	火	水	木	金	土
午前 受付時間 8:30 ～ 11:30	消化器内科	○	○	○	○	○	○
	循環器内科		○	○	○	○	
	内科	呼吸器	○	○	○	○11:00受付終了	
			○			○	○(第2・4週)
	化学療法	○	○	○	○	○	
	泌尿器科		○完全予約制				
	外科	○	○	○(乳腺/甲状腺)	○	○(乳腺/甲状腺)	○
	肛門外科	○		○			○
	整形外科	○	○	○	○	○	○
	脳神経外科		○	○		○	
午後 受付時間 13:00 ～ 16:30	手外科(完全予約制)	○	○		○	○	
	形成外科	○	○		○	○	
	消化器内科	○	○	○	○	○	
	循環器内科	○(隔週)	○(隔週)		○		
	内科	呼吸器	○	○	○		
			○		○		
	泌尿器科			○			
	外科	○	○	○	○	○	
	肛門外科			○			
	整形外科	○		○	○	○(第1.2.4.5週)	
	脳神経外科	○	○もの忘れ(認知症) 外来(完全予約制)			○	

*1 月曜日・火曜日 午後の循環器内科外来は隔週のため、事前にご連絡ください。

アクセス

札幌駅よりJRで6分・琴似駅より徒歩3分



電車・地下鉄をご利用の場合

JR函館本線「琴似駅」徒歩3分
JR学園都市線「八軒駅」徒歩15分
地下鉄東西線「琴似駅」2番出口より徒歩15分

バスをご利用の場合

(琴46)(琴40)「八軒2条1丁目」バス停下車 徒歩1分
(52桑園発寒)「JR琴似駅」バス停下車 徒歩3分

お車をご利用の場合

当院裏の併設駐車場(有料)をご利用ください

診療受付時間

午前 8:30～11:30
午後 13:00～16:30

休診 土曜午後、日曜、祝日、年末年始

当院の感染症対策について

当院では患者様が安心して医療を受けられる環境を提供すべく、感染症予防対策を行っております。

- ・手洗い
- ・手指消毒
- ・マスクの着用
- ・職員の毎朝・昼の検温
- ・受付時に受診患者さまの検温
- ・ソーシャルディスタンスの確保

◆その他の取り組みについては病院ホームページをご覧ください。

IMSグループからのお知らせ

病院・介護施設選びに困ったら
二次検査(再検査・精密検査)の病院選びに困ったら
イムス総合サービスセンター(GSセンター)へ!

STEP 1
相談

STEP 2
情報提供

STEP 3
受診決定

GSセンターにお電話かHPのメールフォームでご相談を！
相談窓口専任スタッフがみなさまのお悩みをお伺いします。

IMSグループ医療機関の選定 医療機関・制度などの情報提供。GSセンターで可能なコーディネート内容の紹介など

ご希望とマッチングした際、IMSグループ医療機関へ受診決定！
【外来受診】受診希望施設へ受診日・時間（予約含む）・対象者さま基本情報等の連絡
【入院（所・居）・転院】希望施設の医療福祉相談室担当者を紹介

メールでカンタン！
IMSグループ病院での受診相談（無料）
gscenter@ims.gr.jp

右のQRコードをご利用いただくと便利です。
24時間365日受付。2営業日以内に返信します。

0800-800-1632

※「050」からはじまるIP電話および国際電話からはご利用いただけません。
受付時間／平日 8:30～17:30 土曜日 8:30～12:30
(日祝・年末年始休み)

イムス総合サービスセンター
http://www.ims.gr.jp/gscenter/



当院ではこれまで、胃がん・大腸がん・膵臓がん・胆管がん・肝臓がんなどの多くの種類の消化器がんの治療を手がけてきました。令和2年4月から外科スタッフの増員に伴い、食道がんの治療も開始いたしましたので、食道がんについて少し解説をいたします。

① 食道がんについて


芸能人で言うと、歌手の桑田佳祐さんが食道がんで手術を受けたことが記憶に新しいと思いますが、すでに手術から10年経過してお元気で活躍されています。

一方で、同時期に食道がんの手術を受けた歌舞伎俳優の中村勘三郎さんは、術後重篤な肺炎を合併し、術後131日、57歳の若さで亡くなっています。

食道がんは一般的には予後の悪いがんといわれていますが、早期発見・早期治療で桑田さんの様に治療する可能性もあります。また、勘三郎さんの様に若くても不幸な転帰をとる場合もあります。

病気に対する知識が少しでもあると、よりよい治療が受けられる可能性があります。

図1



食道はのどと胃の間をつなぐ長さ25cmぐらい、太さは2〜3cmの管状の臓器です。

(図1)

② どんな人が

かかりやすいのか

原因は詳しくわかっていませんが、喫煙、アルコール多飲などが影響しているようです。

また、最近の研究でアルコールを少し飲んだだけで顔が赤くなるようなアルコールへの耐性のない人は、食道がんになりやすいことがわかりました。

食道がんになりやすい要因

- ・喫煙
- ・過剰な飲酒
- ・アルコール耐性のない人
- ・熱い食べ物、飲み物
- ・肉、魚などタンパク質のこげに含まれるニトロソアミン
- ・ストレス
- ・高齢者

③ 自覚症状としてあらわれるもの

早い段階では無症状ですが、進行してくると食道のしみる感じや食物がつかえる感じなどを訴えます。周囲の組織への影響が出ると、声がかすれたり、咳が出るようになることもあります。

④ 食道がんの検査・治療

まず内視鏡検査とエックス線検査が行われます。転移や周囲臓器への影響を観察する目的でCT検査やPET/CT検査が必要になります。

⑤ 治療について

食道がんの治療には大きく分けて、次の四つの治療方法があります。

- ① 内視鏡治療
- ② 手術
- ③ 抗がん剤治療
- ④ 放射線治療

図2

食道がんの治療				
0期	I期	II期	III期	IV期
内視鏡治療	手術	抗がん剤+手術	化学放射線療法(放射線+抗がん剤)	放射線
				抗がん剤

分と転移する可能性があるリンパ節と一緒にとってしまう治療です。食道がんの多くは、胸の中の食道に発生するので、切除するために胸を開く必要が

図3




図4

⑦ 早期発見のポイント

早期発見のポイント

- 45歳以上で最低1回は内視鏡検査
- 50歳以上ではできる限り年1回の内視鏡検査
※特にタバコを吸う人、お酒をよく飲む人、お酒を飲んで顔が赤くなる人は要注意
- 少しでも気になる症状があるときは、怖がらずにできるだけ早く病院に行くこと

予防のポイント

- 毎日の飲酒を避ける
- 禁煙する
- ストレスの少ない生活
- バランスの良い食事

⑧ 予防について

あり、頸部、右胸部、腹部の三力所に傷がつかます。

(図3) 食道がなくなるので、胃を頸部まで持ち上げて食道の代わりにします。

(図4) 手術時間は7〜8時間です。最近では鏡視下で小さな傷で行う手術も行われています。

⑧ もし、食道がんと

言われたら

私たちは専門家としてもっとも相応しいと思われる治療法をお勧めしています。自分が希望しない治療を無理に受ける必要はありませんので、主治医とよく相談をして治療法の選択を下さい。



病院内での勉強会の様子。食道疾患への理解を深めている。



かわさき ひとし
川崎 仁司 医師
日本外科学会（指導医、専門医）
日本消化器外科学会（指導医、専門医）
日本がん治療（認定医）
食道学会食道科（認定医）