

公開日： 2020年4月

プロトコール名	1クール	3週間
アリムタ・カルボプラチン ・ベバシズマブ療法 (非小細胞肺癌) 呼吸器科	総クール	カルボプラチンは最大6クール 他PDまで
	休薬期間	2週間

番号	薬剤名・用量 (mg/body)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	シアノコバラミン 1A(※1参照)																					
	フォリアミン 0.5mg/回/日(※2参照)	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
	デカドロン(0.5) 16錠 2×(※3参照)		→																			→
①	デキサート(1.65) 4A+ アロキシ1V + 生食100mL	→																				
②	アリムタ(500mg/m ²)+生食100mL	→																				
③	カルボプラチン(AUC5) +5%糖液250mL	→																				
④	ベバシズマブ(15mg/kg) + 生食100mL	→																				
⑤	生食50mL	→																				

備考

※1 アリムタ投与開始7日以上前にシアノコバラミン注1A筋注、投与期間中及び投与中止後22日目まで9週毎に筋肉内投与

※2 アリムタ投与開始7日以上前から投与期間中及び投与中止後22日目まで連日フォリアミン0.5mg/回/日経口投与

※3 アリムタ投与の前日と翌日に内服